

Всесвітній день боротьби зі СНІДОМ


Тематичний лекторій
для батьків
Підготувала:
практичний психолог
ЗДО(ясла-садок) 174
Харківської міської ради
Янчук Марина
Олександрівна



1
ГРУДНЯ

**Всесвітній день
боротьби
зі СНІДом**

*World
AIDS Day*



Джошуа Ледерберг, американський генетик

«Єдине, що може реально загрозувати людству – це віруси, світ яких мало відомий нам, які дуже швидко еволюціонують у сучасному техногенному середовищі» -

**Джошуа Ледерберг,
Нобелівський лауреат у галузі
медицини, перша людина, яка
відокремилася вірус СНІДу у крові
людини.**

СНІД – Синдром Набутого Імунодефіциту




- *1 грудня 1974* року в Каліфорнії лікарем *Томасом Едвіном* уперше було діагностовано хворобу людини, яка не поширюється на піддослідних тварин, але симптоми цієї хвороби передавалися через статеві контакти і кров людини.

СНІД

- **Синдром** – тому, що у хворого виникає багато різних симптомів (ознак) захворювань, які розвиваються через ураження захисної системи;
- **Набутий** – тому, що цей стан виникає внаслідок зараження ВІЛ-інфекцією, а не є спадковим.
- **Імунний** – тому, що ВІЛ вражає імунну (захисну) систему організму, яка забезпечує захист від інфекцій і запобігає виникненню пухлин;
- **Дефіцит** – тому, що імунна система не виконує відповідних захисних функцій, через що підвищується схильність до виникнення злоякісних пухлин, збільшується вразливість організму до інших бактеріальних і вірусних інфекцій, які у звичайних умовах є безпечними для людей.

ВІЛ – вірус імунодефіциту ЛЮДИНИ



1982 р. одночасно двома групами вчених - у Національному інституті раку в США, під керівництвом відомого імунолога й вірусолога *Роберта Галло* і в інституті Пастера в Парижі, під керівництвом *Люка Монтаньє*, був відкритий вірус, відомий нині як збудник СНІДу - ВІЛ

Вірус – це мікроскопічний збудник інфекційних хвороб;

Імунодефіцит – зниження функцій імунної системи;

Людина – вид живого організму (біологічний вид), в якому розмножується вірус.

ВІЛ і СНІД – це різні речі:



ВІЛ – інфекція,

СНІД –хвороба.


**1 грудня – Всесвітній день
боротьби зі СНІДом**



**1 грудня ООН
оголосила Всесвітнім
днем боротьби зі
СНІДом.**

**Сьогодні на добу
у світі чотириста
тисяч чоловік
заражується вірусом.**

Форми ВІЛ



ВІЛ – 1 – це вірус розповсюджений в Африці серед людей.

ВІЛ - 2 – Більш агресивна форма, яка розповсюджена на територіях північної Америки та Європи, у тому числі і в Україні.

ВІЛ 3 – на який страждають переважно американці та африканці.

Стадії ВІЛ-інфекції

1. Стадія інкубації – період від моменту інфікування людини до вироблення організмом антитіл. В середньому цей період становить від 3 тижнів до 3 місяці. Варто пам'ятати дві страшних істини: ще з моменту зараження ВІЛ-інфікований є переносником хвороби (тобто, може заражати інших) і він вже невиліковий. Рано чи пізно в нього з'явиться СНІД.

2. Стадія первинних проявів – це період реакції організму на ВІЛ-інфекцію. Може протікати безсимптомно або із загостреннями. Тривалість стадії – до трьох тижнів.

3. Стадія латентна – період повільного прогресування імунодефіциту. Ця стадія може продовжуватись (за різними даними) від 2 до 20 років.

4. Стадія вторинного захворювання – у людини розвивається СНІД. Поступово організм вражається інфекційними та онкологічними захворюваннями. На початку, ці хвороби можуть проходити самі або піддаються лікуванню. З часом проблеми із здоров'ям у ВІЛ-інфікованих стають більшими. Тривалість стадії – в середньому 2 роки. Ось список хвороб, які можуть вражати хворого на СНІД:

Пневмонія Токсоплазмоз і сторигоїдоз мозку та легень

Кандидоз ротової порожнини і стравоходу

Криптококкоз центральної нервової системи

Туберкульоз

Сальмонельоз

Зараження вірусом звичайного герпесу

Фурункули

Лімфотомі

Грибкові захворювання та лишай

Саркома Капоші

5. Термінальна стадія – заключна. Відбувається важке враження організму. Будь-яке лікування стає неефективним. Хворий помирає протягом декількох місяців.

Шляхи зараження



*Ігри з
використаними
медичними
інструментами,
зокрема голками,
шприцами;
наркоманія*

Шляхи зараження



- *Користування чужими предметами особистої гігієни*

Шляхи зараження



*Потрапляння
через ранки або
подряпини
крові хворої
людини*

Шляхи зараження



*Порушення норм
стерилізації
інструментів під
час переливання
крові*

Шляхи зараження



*Від хворої
матері до
дитини у період
вагітності і
годування
груддю.*

Не передається



*Ця хвороба не може
перейти за допомогою
укусу будь-якої комахи,
при використанні
загальних предметів
побуту.*

*Людська слина також
не є переносником
захворювання.*

**Він не знає кордонів,
Він не знає національностей,
Він не знає імен...**

